

**Un début d'infection du type chalazion.** Dans un stade plus avancé, un chalazion forme une boule localisée qui déborde de la paupière.

Le **chalazion** se définit par l'[inflammation](#) et l'[enkystement](#) d'une ou plusieurs [glandes de Meibomius](#) (. au niveau de la [paupière](#). Le chalazion forme une petite boule assez dure située sous la [peau](#) et qui ne fait pas très mal. Il peut se former lorsque le petit canal qui draine une [glande de Meibomius](#) se bouche.

Chalazions chroniques

Il peut arriver que les chalazions deviennent chroniques. Ils peuvent être la conséquence d'une [blépharite](#) due à un manque d'hygiène oculaire. On peut conseiller un nettoyage quotidien de la paupière et des cils avec un gel nettoyant et un graissage de l'oeil avec du liquide graissant.

Dans de très rares cas, il est possible que les chalazions chroniques masquent un [carcinome](#).

Son origine est assez floue, et peu de médecins parviennent à identifier l'origine d'un chalazion.

On soupçonne parfois l'allergie, ou bien la pollution atmosphérique (en région parisienne en France par exemple) d'être à l'origine de l'irritation oculaire.

D'autres suspectent un [acarien](#), le [demodex folliculorum](#) parasite des glandes sébacées et des follicules pileux d'en être à l'origine (un prélèvement de cil et une analyse peuvent en révéler la présence). La recherche s'intéresse aussi au lien entre [demodex folliculorum](#) et [rosacée](#), qui semble aussi provoquer des dysfonctionnements oculaires.

Certains pensent aussi que c'est la [sécheresse oculaire](#) de l'oeil qui provoque le chalazion.

## Traitements [[modifier](#)]

### Traitement à domicile possible [[modifier](#)]

Tout d'abord il est très important de traiter le chalazion le plus tôt possible, avant qu'il ne s'enkyste.

La chaleur semble être la meilleure méthode pour guérir les chalazions. Appliquer des compresses chaudes, pendant 15 à 20 minutes matin et soir, pour permettre de liquéfier le contenu des glandes bloquées. Une petite pointe jaune de liquide cherchant à sortir devrait apparaître sur le bord de la paupière. Ensuite il faut masser la paupière afin de faire sortir ce liquide.

Pour éviter que le chalazion réapparaisse, il est important de changer régulièrement les draps du lit, ou au moins la taie d'oreiller, et de se laver les mains plusieurs fois par jour. Une hygiène rigoureuse et constante permet souvent de régler le problème. Il est possible pour prévenir les infections d'avoir une hygiène quotidienne particulière. Certains ophtalmologistes conseillent le nettoyage quotidien de la paupière et des cils avec des produits tels que le bléphagel (sans ordonnance), matin et soir.

### Prescription Médicale [[modifier](#)]

Appliquer la pommade antibiotique prescrite par votre médecin (capsules de STERDEX le plus souvent, 4 fois par jour, mais il convient d'être prudent dans son utilisation compte tenu de ces effets indésirables et de la composition du récipient unidose comprenant du [trichloréthylène](#), classé carcinogène), afin que le chalazion ne s'infecte pas.

Votre médecin pourra vous prescrire aussi de la doxycycline à faible dose (20 mg 2 fois par jour)

## Intervention Chirurgicale [\[modifier\]](#)

Les manipulations à domicile peuvent se révéler infructueuses, et l'ophtalmologiste peut décider d'inciser la paupière pour extraire la glande subissant l'inflammation, dans un service ambulatoire.

En effet, pris trop tard, le chalazion s'enkyste (voir [kyste](#)) et devient impossible à drainer manuellement.

Pour des questions d'esthétique, cette incision a le plus souvent lieu à l'intérieur de la paupière.

L'incision doit être effectuée dans le sens du canal obstrué, de façon à ce que le chirurgien ne coupe pas d'autres canaux, ce qui aurait pour effet de créer d'autres chalazions.